

# CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI PARMA

C.F. 80004050342 - LL.RR. 22/5/1996 n°16 - 15/7/2011 n° 9  
VIALE GRAMSCI 26/C - 43126 PARMA - TEL. 0521-292910 - FAX 0521-291233

E-mail: [fitosanparma@regione.emilia-romagna.it](mailto:fitosanparma@regione.emilia-romagna.it) PEC: [fitosanparma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:fitosanparma@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Prot. n.° 147

Parma, li 23.05.2014

Assessorato Provinciale Agricoltura e  
Alimentazione

Comunità Montane

Comuni

Associazioni professionali agricole

Associazioni dei produttori

Consorzio tutela vini Colli di Parma

Consorzio prov. Viticoltura

Commercianti prodotti per l'agricoltura

Azienda Agraria Sper. Stuard

Loro Sedi


OGGETTO: lotta obbligatoria contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata della vite - Anno 2014.

Per opportuna conoscenza in merito alle prescrizioni di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite da adottare nel 2014 nelle aziende viticole e nei vivai della provincia di Parma, si invia, in allegato, il volantino applicativo che riassume gli adempimenti previsti dalla determinazione n. 5799 del 02 maggio 2014 del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna. Si allega, inoltre, l'elenco dei prodotti ammessi in produzione integrata ed in agricoltura biologica e le date indicative dei trattamenti obbligatori.

Con la presente si chiede la Vostra cortese collaborazione per darne la massima diffusione.

Nel ringraziare si porgono i più distinti saluti.

Il Direttore  
(Valentino Dr. Testi)



## LOTTA OBBLIGATORIA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE IN PROVINCIA DI PARMA ANNO 2014

Adempimenti previsti dalla determinazione n. 5799 del 02 maggio 2014, del Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite (D.M. 31 maggio 2000). Le aree vitate dichiarate "zone di insediamento", ai sensi dell'art. 5, sono quelle presenti nei comuni di: Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore, Solignano, Terenzo, Traversetolo, Varano de' Melegari.

### ADEMPIMENTI PREVISTI NEL 2014

**Nelle "zone di insediamento" obbligo di estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata o di asportare da ogni pianta le parti che presentano sintomi sospetti di Flavescenza dorata.**

**Obbligo di estirpare le piante infette nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di Flavescenza dorata e divieto di prelevare materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale.**

**Al di fuori delle "zone di insediamento": obbligo di estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata presente nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da Flavescenza dorata.**

**Obbligo di eseguire in tutte le aree vitate della provincia di Parma n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus*, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario regionale e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale (vedi [www.stuard.it](http://www.stuard.it)).**

**Obbligo di eseguire nei vigneti a conduzione biologica, ubicati in tutte le aree vitate della provincia di Parma, almeno n. 2 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario regionale e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale (vedi [www.stuard.it](http://www.stuard.it)).**

**Obbligo di eseguire nei campi di piante madri per marze e per portinnesti n. 2 trattamenti e nei barbatellai n. 3 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*.**

## TRATTAMENTI OBBLIGATORI CONTRO SCAFOIDEO

Per salvaguardare le api i trattamenti contro *Scaphoideus titanus* vanno eseguiti dopo la completa sfioritura della vite e dopo aver sfalciato da almeno 48-72 ore le erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura come previsto dall'art. 15 della L.R. 25 agosto 1988 n. 35 e dal DPGR 4 marzo 1991 n. 130.

Il primo trattamento dovrà essere realizzato a partire dal 10 giugno 2014, e comunque non prima della completa sfioritura della vite, ed entro il 10 luglio 2014. Nel vigneti in cui vi è l'obbligo di eseguire 2 trattamenti questi dovranno comunque essere effettuati nel periodo compreso fra 10 giugno e 31 luglio 2014.

I bollettini tecnici provinciali, consultabili sul sito [www.stuard.it](http://www.stuard.it), indicano le epoche consigliate per eseguire gli interventi sulla base del monitoraggio eseguito dal Consorzio Fitosanitario Provinciale.

Di seguito si riportano gli insetticidi ammessi in Lotta Integrata, ai sensi dei seguenti provvedimenti: Reg. Ce 1698/2005, Reg. CE 1234/2007, L.R. 28/98 e L.R. 28/99, ed in agricoltura biologica, ai sensi del Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2008.

Le aziende viticole che non rientrano in tali campi applicativi possono utilizzare anche altri prodotti insetticidi purché autorizzati sulla vite ed efficaci contro le cicaline della vite.

### PRODUZIONE INTEGRATA: N. 1 TRATTAMENTO OBBLIGATORIO

| Sostanza attiva      | Formulato Commerciale   | Dose<br>g o ml/hl                  | Epoca<br>intervento         |
|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|
| ① Buprofezin         | Applaud Plus (Sipcam)   | 100 - 150<br>(1,5 kg/ha)           | 20 giugno<br>-<br>05 luglio |
| ② Clorpirifos        | Pyrinex ME (Makhteshim),<br>Dursban 75 WG (Dow), Alisè 75 WG (Sipcam),<br>Piridane 480 (Chimiberg), Cator (Scam),<br>Zelig 480 EC (Makhteshim), ecc | 160 - 210<br>70<br>85 - 110<br>110 |                             |
| ② Clorpirifos metile | Devox (Scam), Cleaner 22 (Sivam),<br>Runner M (Sipcam), Kukar 22 (Gowan), Metidane<br>22 (Chimiberg)  | 100 - 200<br>150                   |                             |
| ③ Etofenprox         | Trebon Up (Sipcam)  | 50                                 |                             |
| ④ Thiametoxam        | Actara 25 WG (Syngenta)   | 20 (200 g/ha)                      |                             |

**Con elevata presenza di Scafoideo è consigliata l'esecuzione di 2 trattamenti specifici: il 1° nel periodo 10 - 20 giugno ed il secondo dopo circa 30 giorni.**

- ① Buprofezin: regolatore di crescita efficace sulle forme giovanili. L'intervento va anticipato di 7-10 giorni.
- ② Clorpirifos etile e Clorpirifos metile si possono impiegare al massimo una volta all'anno contro Scafoideo. Gli esteri fosforici sono esclusi nella DIA (Difesa Integrata Avanzata)
- ③ Etofenprox può influire negativamente sullo sviluppo dei fitoseidi.
- ④ Thiamethoxam può essere utilizzato una sola volta all'anno.

### AGRICOLTURA BIOLOGICA: N. 2 TRATTAMENTI OBBLIGATORI

**Nelle zone con elevata presenza di Scafoideo è fortemente raccomandata l'esecuzione di un 3° intervento.**

| Sostanza attiva   | Formulato Commerciale   | Dose<br>g o ml/hl | Epoca<br>intervento       |
|---|---|-------------------|---------------------------|
| Piretrine pure<br>(con o senza<br>Piperonil<br>Butossido) | Keniattox Verde, Piresan Plus (Cypyr), Asset (Serbios),   | 70-80             | 1° dal 10<br>al 20 giugno |
|   | Lumix verde (Manica), Agro-Pyr (Ital-agro), Piretro<br>verde (Cypyr), Piretro Natura (Cerrus), ecc. | 140-160           |                           |
|   | Biopiren Plus (Biogard Division)  | 150-200           | 2° dopo 25<br>- 30 giorni |
|   | Pyganic 1.4 (Biogard Division)  | 150-250           |                           |

Le aziende agricole ubicate nelle aree nelle quali è previsto un trattamento obbligatorio che intendono utilizzare i prodotti ammessi in agricoltura biologica dovranno eseguire i due trattamenti previsti per i vigneti a conduzione biologica.