

LOTTA OBBLIGATORIA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE IN PROVINCIA DI PARMA ANNO 2020

Adempimenti previsti dalla Determinazione n. 8073 del 10 maggio 2019 del Responsabile del Servizio Fitosanitario "Prescrizioni per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Emilia-Romagna". Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31 maggio 2000 sono dichiarate "zone di insediamento" le aree vitate dell'intero territorio della provincia di Parma.

ADEMPIMENTI PREVISTI NEL 2020

Nelle "zone di insediamento" obbligo di estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata o di asportare obbligatoriamente da ogni pianta le parti che presentano sintomi sospetti di Flavescenza dorata.

Obbligo di estirpare le piante infette nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di Flavescenza dorata e di vietare il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale.

Obbligo di estirpare obbligatoriamente al di fuori delle "zone di insediamento" ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata presente nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da Flavescenza dorata.

Obbligo di eseguire in tutte le aree vitate della provincia di Parma **n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus*, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale (vedi www.fitosanitario.pr.it e www.stuard.it)**

Obbligo di eseguire nei vigneti a conduzione biologica, ubicati in tutte le aree vitate della provincia di Parma, **almeno n. 2 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario regionale e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale (vedi www.fitosanitario.pr.it e www.stuard.it).**

Obbligo di eseguire nei campi di piante madri per marze e per portinnesti **n. 2 trattamenti e nei barbatellai **n. 3 trattamenti** contro il vettore *Scaphoideus titanus*.**

TRATTAMENTI OBBLIGATORI CONTRO SCAFOIDEO

Per salvaguardare le api i trattamenti contro *Scaphoideus titanus* vanno eseguiti dopo la completa sfioritura della vite e dopo aver sfalciato da almeno 48-72 ore le erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura come previsto dall'Art. 8 comma 1 e 2 dalla L.R. 2/2019.

Il primo trattamento dovrà essere realizzato a partire dal 10 giugno 2020, e comunque non prima della completa sfioritura della vite, ed entro e non oltre il 10 luglio 2020. Nei vigneti in cui vi è l'obbligo di eseguire 2 trattamenti, il primo dovrà essere realizzato nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 10 agosto 2020.

I bollettini tecnici provinciali indicano le epoche consigliate per eseguire gli interventi sulla base del monitoraggio eseguito dal Consorzio Fitosanitario Provinciale.

Di seguito si riportano gli insetticidi ammessi in Produzione Integrata volontaria, ai sensi dei Regolamenti CE 1698/2005, CE 1308/2013, UE 1305/2013, UE 1234/07, L.R. 28/98 e L.R. 28/99, ed in Agricoltura biologica, ai sensi dei Regolamenti CE 834/2007, CE 889/2008, UE n. 354/2014 e UE 673/2016, UE 1584/2018, UE 2164/2019. Le aziende viticole che non rientrano in tali campi applicativi possono utilizzare anche altri insetticidi purché autorizzati per la lotta alle cicaline della vite.

PRODUZIONE INTEGRATA: N. 1 TRATTAMENTO OBBLIGATORIO

Sostanza attiva	Formulato Commerciale	Dose (g o ml/hl)	Epoca intervento
Sali potassici di acidi grassi	Ciopper (De Sangosse), Flipper (Bayer)	1000-2000 (4-20 l/ha)	dal 20 al 30 giugno
	Nobil (Ital-agro)	1500-2000	
Acetamiprid	Epik SL (Sipcam)	150 (1,5 l/ha)	
	Kestrel (Sumitomo)	25-45 (0,25-0,35 l/ha)	
❶ Acrinatrina	Rufast E-Flo (Cheminova)	20-60 (0,3 l/ha)	
❶ Tau-fluvalinate	Evure Pro (Syngenta), Klartan 20 EW (Dow), Mavrik smart (Adama)	30-300 (0,3 l/ha)	
	Flupyradifurone	Sivanto Prime (Bayer)	
❷ Etofenprox	Trebon UP (Sipcam), Sword UP (Dow)	50 (0,5 l/ha)	

Con elevata presenza di Scafoideo è consigliata l'esecuzione di 2 trattamenti specifici: il 1° nel periodo 20-30 giugno ed il secondo dopo circa 30 giorni.

- ❶ Al massimo un intervento all'anno con Acrinatrina e Tau-fluvalinate.
- ❷ Etofenprox può essere utilizzato solo una sola volta nel corso della stagione.

AGRICOLTURA BIOLOGICA: N. 2 TRATTAMENTI OBBLIGATORI

Sostanza attiva	Formulato Commerciale	Dose (g o ml/hl)	Epoca intervento
Piretrine pure (*)	Asset (Serbios)	64 (0,96 l/ha)	1° dal 10 al 20 giugno 2° dopo 7-10 giorni
	Abanto (Agrimix), Piretro Natura (Cerrus), Lince (Scam)	75-90 (0,75 l/ha)	
Biopiren Plus (CBC Europe), Agro-Pyr (Italagro), Piretro verde (Copyr), Piretro Actigreen (Chimiberg), Several (Sumitomo), Pyganic (CBC Biogard)	140-160 (2,4 l/ha)		
Sali potassici di acidi grassi	Ciopper (De Sangosse), Flipper (Bayer)	1000-2000 (4-20 l/ha)	
	Nobil (Ital-agro)	1500-2000	

Nelle zone con elevata presenza di Scafoideo è fortemente raccomandata l'esecuzione di un 3° intervento.

(*) Intervenire nelle ore serali, bagnare bene la vegetazione, acidificare l'acqua se il pH è > 7.

Le aziende agricole ubicate nelle aree nelle quali è previsto un trattamento obbligatorio che intendono utilizzare i prodotti ammessi in agricoltura biologica dovranno eseguire i due trattamenti previsti per i vigneti a conduzione biologica.